

Актуализирани изисквания за лечение с аналогови инсулини, SGLT2 инхибитори и GLP1-RA

1. Аналогови инсулини

Вече е възможно започване на лечение с аналогов инсулин при изпълнение на следните критерии:

- Потвърдена диагноза ЗД тип 2;
- HbA1c > 7.0% при предходна терапия;
- Проведено обучение за инсулинова терапия;
За стартиране е необходим **е-протокол**, който се заверява в РЗОК, без допълнителна експертиза.

2. Инкретинови миметици (GLP-1 RA)

- Прагът за метаболитен контрол остава **HbA1c > 7.0%** за всички терапевтични линии;
- Разписани са условия за започване след Met/SU, преминаване от DPP-4/SGLT2, както и за комбиниране със SGLT2 инхибитор при доказано сърдечно-съдово заболяване.
- Добавянето към базален инсулин е възможно при повишение на HbA1c след 6-месечно проследяване.

3. SGLT2 инхибитори

- Прагът за метаболитен контрол остава **HbA1c > 7.0%** за всички терапевтични линии;
- Описани са ясни критерии за добавяне на SGLT2-и към GLP-1 RA

4. Фиксирани комбинации GLP-1 + базален инсулин

Критериите за започване и преминаване към комбиниран препарат са ясно дефинирани, включително изисквания за предходна терапия, липса на бързодействащ инсулин и отсъствие на изключващи критерии.